



# Stomp 400 SC

**Toelatingsnummer 10766 N W.13**

**Productgroep:** herbicide  
**Formulering:** suspensie concentraat  
**Werkzame stof:** 400 g/l pendimethalin



N: Milieugevaarlijk

**Waarschuwingzinnen:**

50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Veiligheidsaanbevelingen:**

61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/ veiligheidsgegevenskaart.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.  
Bevat pendimethalin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## Wettelijk gebruiksvoorschrift

### Toepassingen

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van:

- consumptieaardappelen;
- wintertarwe, wintergerst en winterrogge;
- snijmaïs en korrelmaïs;
- landbouwerwten en droog te oogsten veldbonen;
- teunisbloem
- raketblad
- cichorei
- meekrap
- wortelen
- zaaiuien, 1e- en 2e- jaars plantuien, zaaiprei, plantprei, bieslook en sjalotten;
- zilveruien, mits toegepast voor opkomst;
- aspergeplantgoed
- bloembollen.

Toepassing door middel van een luchtvaartuig is niet toegestaan.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op perceelsranden die niet grenzen aan oppervlakte water uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de volgende driftreducerende maatregelen:

- wintertarwe, wintergerst, winterrogge, landbouwerwten en droog te oogsten bonen: driftarme doppen + kantdop.
- overige teelten: driftarme doppen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing op perceelsranden die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van driftarme doppen in de teelt van cichorei, minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in de teelt van raketblad en van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de overige teelten. Voor de teelt van cichorei, raketblad, meekrap en asperge geldt bovendien dat op percelen die grenzen aan oppervlaktewater maximaal 1 toepassing per seizoen is toegestaan.

## **Gebruiksaanwijzing**

Het gebruik in de teelt van cichorei, raketblad, meekrap en aspergeplantgoed is op basis van een vereenvoudigde uitbreiding (door derden). Deze vereenvoudigde uitbreiding is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt.

### **Algemeen**

Stomp 400 SC is een bodemherbicide, dat werkzaam is tegen éénjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden.

Het middel is goed werkzaam tegen duist, windhalm, straatgras en hanenpoot. Groene naalदार en vingergrassen zijn minder gevoelig. Bijna alle belangrijke tweezaadlobbige akkeronkruiden zijn gevoelig met uitzondering van echte kamille, korenbloem, knopkruid, klein kruiskruid en wikkesoorten. Na opkomst van het onkruid kan de werking tegenvallen.

Om schade aan gewassen te voorkomen, mag het middel niet in aanraking komen met zaden. Er moet dan ook voldoende diep gezaaid worden, minimaal 2,5 cm, waarbij de zaden goed bedekt moeten zijn met grond. Het gebruik van het middel op gronden met meer dan 35% afslibbaar wordt daarom afgeraden.

Na de toepassing van Stomp 400 SC kunnen er geen grassen als ondervrucht worden gezaaid. Voor een optimale werking is voldoende vocht tijdens en na de toepassing noodzakelijk. Op droge grond en bij droge omstandigheden na de toepassing kan de werking tegenvallen. Stomp 400 SC niet toepassen op grondsoorten met meer dan 10% humus.

## **Toepassingen**

### **Middenvroege en late consumptieaardappelen**

Toepassen voor opkomst van de aardappelen na het anaarden op een bezakte rug, in een tankmenging met een daarvoor toegelaten herbicide.

Dosering: 2,5 l/ha

### **Wintertarwe en wintergerst**

Na opkomst in het tweebladstadium van wintertarwe en wintergerst.

Dosering: 3,25 l/ha.

### **Wintertarwe, wintergerst en winterrogge**

Toepassen direct na het zaaien op onkruidvrije grond.

Dosering: 3,25 l/ha

**Snijmaïs en korrelmaïs**

Toepassen direct na het zaaien tot aan het tweebladstadium van de maïs. Het middel dient voor een voldoende brede werking in combinatie met een andere herbicide te worden toegepast bij voorkeur op een vochtige en bezakte grond.

Bij toepassing kort na opkomst op jong onkruid spuiten in tankmengsel met een daarvoor toegelaten middel.

Dosering:

- 4,0 l/ha toegepast direct na zaai, gevolgd door een bespuiting na opkomst met een daarvoor toegelaten herbicide;
- 4,0 l/ha + van een terbutylazin houdend middel, toegepast direct na zaai tot in het tweedebladstadium van de maïs;
- 2,5 l/ha + een daartoe toegelaten herbicide toegepast kort na opkomst van de maïs op jong onkruid.

**Waarschuwing:**

Om homogeniteit van de spuitvloeistof te behouden, dient bij tankmenging met andere middelen de roerinstallatie tijdens de bespuiting in werking te blijven.

**Landbouwerwten (ronde groene erwten, gele erwten, schokkers, kapucijners, rozijnerwten) en droog te oogsten veldbonen.**

Toepassen direct of kort na zaaien op onkruidvrije grond.

Dosering:

- 2,5 l/ha op gronden met minder dan 30% afslibbaar of 5% humus;
- 3,25 l/ha op gronden met meer dan 30% afslibbaar of 5% humus.

**Teunisbloem**

Toepassen direct of kort na zaaien op onkruidvrije grond.

Dosering:

- 2,5 l/ha op gronden met minder dan 30% afslibbaar of 5% humus;
- 3,25 l/ha op gronden met meer dan 30% afslibbaar of 5% humus.

**Raketblad**, toepassen direct na zaai of na opkomst bij het 2-3 bladstadium van raketblad (3-5 cm hoogte).

Dosering: 1,0 l/hectare

**Cichorei**, toepassen na opkomst. Indien nodig de toepassing herhalen met een maximum van 2 l/ha per jaar.

Dosering: 0,5 l/ha

**Meekrap**, toepassen na het planten of in het voorjaar bij het kiemen van de onkruiden. Indien nodig de toepassing herhalen met een maximum van 4 l/ha per jaar.

Dosering: 2,0 l per hectare.

**Wortelen**

Toepassen direct of kort na het zaaien.

Dosering: 2,0 l/ha

**Zaaiui, 1e- en 2e- jaars plantui en sjalot**

Toepassen voor opkomst, direct of kort na zaaien, op onkruidvrije grond.

Dosering:

- 2,5 l/ha op gronden met minder dan 30% afslibbaar;
- 3,25 l/ha op gronden met meer dan 30% afslibbaar of 5% humus;

Toepassen na opkomst (vanaf kramstadium) of na planten zodra de eerste kiemende onkruiden worden waargenomen. De onkruiden mogen echter niet verder dan het kiembladstadium zijn ontwikkeld. In verband met mogelijke nakiemers heeft een gedeelde toepassing de voorkeur.

**Dosering:**

- enkelvoudige toediening: 2,5 l/ha;
- gedeelde toediening: bijvoorbeeld tweemaal 1,25 l/ha.

Het valt niet uit te sluiten dat bij zaaiuien onder bepaalde omstandigheden, met name in geval van een trage opkomst, enige geelverkleuring of groeivertraging van het gewas optreedt. Dit leidt echter over het algemeen niet tot opbrengstderving.

**Plantprei**

Toepassen kort na het planten op onkruidvrije grond.

Dosering: 2,5 l/ha

Het valt niet uit te sluiten dat onder bepaalde omstandigheden, met name in geval van een trage ontwikkeling, enige geelverkleuring of groeivertraging van het gewas optreedt. Dit leidt echter over het algemeen niet tot opbrengstderving.

**Zaaiprei**

Toepassen direct na of kort na zaaien op onkruidvrije grond.

Dosering: 2,0 l/ha

Het valt niet uit te sluiten dat onder bepaalde omstandigheden, met name in geval van een trage opkomst, enige geelverkleuring of groeivertraging van het gewas optreedt. Dit leidt echter over het algemeen niet tot opbrengstderving.

**Bieslook**

Toepassen direct of kort na zaaien op onkruidvrije grond.

**Dosering:**

- 2,5 l/ha op gronden met minder dan 30% afslibbaar of 5% humus;
- 3,25 l/ha op gronden met meer dan 30% afslibbaar of 5% humus.

**Zilverui**

Toepassen voor opkomst, direct of kort na zaaien, op onkruidvrije grond.

**Dosering:**

- 2,5 l/ha op gronden met minder dan 30% afslibbaar of 5% humus;
- 3,25 l/ha op gronden met meer dan 30% afslibbaar of 5% humus

Het valt niet uit te sluiten dat onder bepaalde omstandigheden, met name in geval van een trage opkomst, enige geelverkleuring of groeivertraging van het gewas optreedt. Dit leidt echter over het algemeen niet tot opbrengstderving.

**Opkweek van aspergeplantgoed**, toepassen na het planten of in het voorjaar bij het kiemen van de onkruiden. Indien nodig de toepassing herhalen met een maximum van 4 l/ha.

Dosering: 2,0 l per hectare.

**Bloementeel**

Alleen toepassen in voorjaarsbloeiërs (onder andere tulp, narcis en hyacint) en lelie.

Toepassen voor opkomst van de bollen op onkruidvrije grond. Niet toepassen op spuittuinen.

Dosering: 2,0 l/ha

**Mislukken teelt**

Bij het mislukken van de teelt wordt afgeraden in hetzelfde jaar, afhankelijk van de dosering zaaidiepte en periode tussen toepassing van Stomp 400 SC en zaai van het vervanggewas, bieten, uien en grassen als vervanggewas te zaaien.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruikdoeleinden. Een uitzondering daarop vormt de toepassing in cichorei, raketblad, meekrap en aspergeplantgoed, die zonder daaraan ten grondslag liggend werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek is toegelaten. Het gebruik van het product in cichorei, raketblad, meekrap en aspergeplantgoed is derhalve volledig voor risico van de toepasser. Voor alle toepassingen geldt dat aangezien de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

### **Re-entry**

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.